

Première partie

Énoncés des épreuves

1 ESCP Europe 2018, énoncé

Exercice 1 (ensemble de matrices)

Soit a, b, c et d des réels et soit \mathcal{E} l'ensemble des matrices carrées $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ d'ordre 2 qui vérifient les deux conditions : $a + d = 0$ et $ad - bc = 0$.

- 1/ a/ Les matrices de \mathcal{E} sont-elles inversibles ?
- b/ Vérifier que les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ appartiennent à \mathcal{E} .
- c/ En déduire que la somme et le produit de deux matrices de \mathcal{E} n'appartiennent pas nécessairement à \mathcal{E} .
- d/ Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de \mathcal{E} . Déterminer la matrice M^2 et en déduire, pour tout entier $n \geq 2$, la matrice M^n .

Dans toute la suite de l'exercice, on pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ et on note $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice identité d'ordre 2.

- 2/ a/ Justifier l'inversibilité de la matrice A .
- b/ On pose : $K = A - 3I$. Vérifier que la matrice K appartient à \mathcal{E} .
- c/ On rappelle que si B est une matrice carrée d'ordre 2, on pose par convention $B^0 = I$.
- i/ Exprimer, pour tout entier naturel n , la matrice A^n en fonction de n , I et K .
- ii/ Donner l'expression de A^n sous forme d'un tableau matriciel.
- 3/ a/ Établir l'existence d'un unique couple $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ que l'on déterminera, pour lequel $A^2 + \alpha A + \beta I$ est la matrice nulle.
- b/ Retrouver le fait que la matrice A est inversible et montrer que :

$$A^{-1} = \frac{2}{3}I - \frac{1}{9}A$$

- c/ En déduire que :

$$A^{-1} = \frac{1}{3}I - \frac{1}{9}K$$

et vérifier que la formule trouvée à la question 2/c/i/ pour tout $n \in \mathbb{N}$ est encore valide pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

- 4/ a/ Montrer que la seule valeur propre possible λ de A est $\lambda = 3$.
- b/ Vérifier que le réel 3 est effectivement valeur propre de A ; déterminer l'ensemble des vecteurs propres associés à cette valeur propre.

Exercice 2 (suite d'intégrales et Scilab)

Dans tout l'exercice, on pose $I_0 = \int_1^e t \, dt$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_1^e t (\ln t)^n \, dt$.

- 1/ a/ Calculer I_0 .
 b/ Montrer que pour tout entier naturel n , $I_n \geq 0$.
 c/ Montrer que la suite $(I_n)_{n \geq 0}$ est décroissante puis qu'elle est convergente.
- 2/ a/ Pour tout entier naturel n , soit f_n la fonction définie sur $[1, e]$ par :

$$\forall t \in [1, e] \quad f_n(t) = (\ln t)^{n+1}$$

On note f'_n la dérivée de f_n . Pour tout $t \in [1, e]$, calculer $f'_n(t)$.

- b/ À l'aide d'une intégration par parties, établir pour tout entier naturel n , la relation (*) suivante :

$$2I_{n+1} + (n + 1)I_n = e^2 \quad (*)$$

- c/ En déduire la valeur de I_1 .
 d/ En utilisant la relation (*) et la décroissance de la suite $(I_n)_{n \geq 0}$, établir pour tout entier naturel n , l'encadrement suivant :

$$\frac{e^2}{n + 3} \leq I_n \leq \frac{e^2}{n + 2}$$

- e/ En déduire les limites respectives des deux suites $(I_n)_{n \geq 0}$ et $(nI_n)_{n \geq 0}$.
 f/ Utiliser la relation (*) pour compléter le script SCILAB suivant afin qu'il calcule et affiche I_n pour une valeur de n entrée par l'utilisateur.

```

n = input("donner une valeur à n : ")
I = .....
for k = 1:n
    I = .....
end
disp(I)
```

- 3/ a/ Établir, pour tout entier naturel n , l'encadrement :

$$\frac{(3n + 10)e^2}{(n + 3)(n + 4)} \leq 2I_{n+1} + I_n \leq \frac{(3n + 7)e^2}{(n + 2)(n + 3)}$$

- b/ Pour tout entier naturel n , on pose : $w_n = n(e^2 - nI_n)$. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 3e^2$$

- 4/ À l'aide d'un raisonnement par récurrence, établir pour tout entier naturel n , l'égalité :

$$I_n = \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}} \left(e^2 \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{k!} - 1 \right)$$

Exercice 3 (probabilités discrètes et Scilab)

On suppose que l'on dispose d'un stock illimité de boules rouges et de boules blanches indiscernables au toucher. Une urne contient initialement une boule rouge et une boule blanche indiscernables au toucher.

On effectue dans cette urne une succession d'expériences aléatoires selon le protocole suivant : on extrait une boule de l'urne et après chaque tirage, la boule tirée est remise dans l'urne et on ajoute dans l'urne une boule de la même couleur que la boule tirée.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note X_n (respectivement Y_n) la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges (respectivement blanches) contenues dans l'urne à l'issue de la n -ième expérience, c'est-à-dire après le tirage (avec remise) d'une boule et l'ajout d'une boule supplémentaire.

Pour tout entier $k \geq 1$, on note R_k (respectivement B_k) l'événement : « tirer une boule rouge (respectivement blanche) lors du k -ième tirage ».

- 1/ a/ Justifier que $X_1(\Omega) = \llbracket 1, 2 \rrbracket$. Donner la loi de X_1 .
Calculer $E(X_1)$ et $V(X_1)$.
 - b/ Exprimer les événements $[X_2 = 1]$, $[X_2 = 2]$ et $[X_2 = 3]$ en fonction des événements B_1 , B_2 , R_1 et R_2 .
 - c/ Montrer que X_2 suit la loi discrète uniforme sur $\llbracket 1, 3 \rrbracket$.
En déduire $E(X_2)$ et $V(X_2)$.
- 2/ a/ Donner sous forme de tableau la loi conjointe du couple (X_1, X_2) .
 - b/ Calculer la covariance de X_1 et X_2 . Les variables aléatoires X_1 et X_2 sont-elles indépendantes ?
- 3/ a/ Pour tout entier $n \geq 1$, exprimer l'événement $[X_n = 1]$ en fonction des événements B_1, B_2, \dots, B_n .
 - b/ Montrer que :

$$P([X_n = 1]) = \frac{1}{n+1}$$

De même, calculer $P([X_n = n+1])$.

- 4/ a/ Établir, pour tout entier $k \in \llbracket 2, n+1 \rrbracket$, les égalités suivantes :

$$P_{[X_n = k-1]}([X_{n+1} = k]) = \frac{k-1}{n+2}$$

et

$$P_{[X_n = k]}([X_{n+1} = k]) = \frac{n+2-k}{n+2}$$

- b/ En déduire pour tout $k \in \llbracket 2, n+1 \rrbracket$, une relation entre $P([X_{n+1} = k])$, $P([X_n = k])$ et $P([X_n = k-1])$.

- c/ À l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que pour tout entier $n \geq 1$, la variable aléatoire X_n suit la loi discrète uniforme sur $\llbracket 1, n + 1 \rrbracket$.
- 5/ Compléter le programme SCILAB suivant afin qu'il simule une réalisation de la variable aléatoire X_n où l'entier n est entré au clavier.

```

n = input("donner une valeur à n : ")
r = 1; b = 1
for k = 1:n
    if rand() < r/(r+b) then .....
                                else .....
    end
end
x = .....
disp(x)
    
```

- 6/ a/ Justifier que les variables aléatoires X_n et Y_n sont de même loi.
 b/ Pour tout entier $n \geq 1$, que vaut $X_n + Y_n$?
 c/ Quel est le coefficient de corrélation linéaire $\rho(X_n, Y_n)$ de X_n et Y_n ?

Exercice 4 (probabilités continues et estimation)

Dans tout l'exercice, λ désigne un réel strictement positif.

- 1/ Soit Z une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre λ dont une densité g est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Rappeler les valeurs respectives de $E(Z)$ et $V(Z)$.

En déduire la valeur de $E(Z^2)$ ainsi que la valeur de $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx$.

- 2/ Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \lambda x g(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- a/ Vérifier que f est une densité de probabilité.
Dans toute la suite, on note U une variable aléatoire de densité f .
 b/ Montrer que la variable aléatoire U admet une espérance dont on donnera la valeur.

- 3/ a/ À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout réel $A > 0$, on a :

$$\int_0^A x^3 e^{-\lambda x} dx = -\frac{A^3}{\lambda} e^{-\lambda A} + \frac{3}{\lambda} \int_0^A x^2 e^{-\lambda x} dx$$

- b/ En déduire l'égalité

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-\lambda x} dx = \frac{6}{\lambda^4}$$

ainsi que l'existence de la variance de U .

- c/ Calculer $V(U)$.

- 4/ On note F la fonction de répartition de la variable aléatoire U .

On rappelle que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

- a/ Établir la relation :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - (1 + \lambda x)e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- b/ Justifier l'égalité :

$$P(|U - E(U)| \leq E(U)) = P\left(\left[0 \leq U \leq \frac{4}{\lambda}\right]\right)$$

- c/ Sachant que $e^4 \simeq 54,6$, établir l'inégalité :

$$P(|U - E(U)| \leq E(U)) > 0,9$$

- 5/ On suppose dans cette question que le paramètre λ est inconnu.

On pose $a = \frac{1}{\lambda}$ et on veut estimer ponctuellement le paramètre inconnu a .

Soit $(U_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la même loi que U . Pour tout entier $n \geq 1$, on pose :

$$\overline{U}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n U_k$$

- a/ Construire à partir de \overline{U}_n un estimateur sans biais W_n du paramètre a .

- b/ Calculer $V(W_n)$ et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} V(W_n)$.

- c/ En déduire que l'on a :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|W_n - a| \geq \varepsilon) = 0$$

2 ECRICOME 2018, énoncé

Exercice 1 (matrices et équations matricielles)

On considère les trois matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ci-dessous :

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 5 & -4 & -5 \\ -8 & 8 & 6 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1/ On pose :

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad V_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad V_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Montrer que V_1 , V_2 et V_3 sont des vecteurs propres de la matrice M , et préciser les valeurs propres associées.

2/ En déduire une matrice P telle que $MP = PD$.

3/ a/ Vérifier que $X^3 + X^2 + 1$ est un polynôme annulateur de P .

b/ En déduire que P est inversible et déterminer P^{-1} .

4/ Soit X une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On pose $Y = P^{-1}XP$.

a/ Vérifier que :

$$Y^2 = P^{-1}X^2P$$

b/ Montrer que X vérifie l'équation

$$(*) : X^2 - 4X + I = M$$

si et seulement si Y vérifie

$$(**) : Y^2 - 4Y + I = D$$

5/ a/ Déterminer la matrice Y diagonale vérifiant l'équation (**) et dont les coefficients diagonaux sont tous inférieurs à 2.

b/ En déduire une matrice X solution de l'équation (*).

On explicitera les neuf coefficients de la matrice X .

Exercice 2 (fonctions et probabilités continues)

Partie I

Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = x^2 - 4 \ln(x)$$

1/ Étudier le sens de variation de g , et vérifier que g admet un minimum sur $]0, +\infty[$ égal à $2(1 - \ln(2))$.

2/ En déduire le signe de $g(x)$ pour tout réel x de $]0, +\infty[$.

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x}{4} + \frac{1 + \ln(x)}{x}$$

On appelle (\mathcal{C}) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (unité graphique 2 cm).

3/ Déterminer la limite de f en 0. Interpréter graphiquement le résultat.

4/ Déterminer la limite de f en $+\infty$.

5/ Montrer que la droite (D) d'équation $y = \frac{x}{4}$ est asymptote à la courbe (\mathcal{C}) .

6/ Étudier la position relative de (\mathcal{C}) et de (D) . On montrera en particulier que (D) coupe (\mathcal{C}) en un point A dont on calculera les coordonnées.

7/ Étudier le sens de variation de f . Dresser le tableau de variation de f .

8/ a/ Vérifier que pour tout réel x de $]0, +\infty[$, on a :

$$f''(x) = \frac{2 \ln(x) - 1}{x^3}$$

b/ Étudier la convexité de f .

La courbe (\mathcal{C}) possède-t-elle des points d'inflexion ?

9/ On donne :

$$\frac{1}{e} \simeq 0,4 \quad \sqrt{e} \simeq 1,6 \quad f(\sqrt{e}) \simeq 1,3 \quad f'(\sqrt{e}) \simeq 0,1$$

Représenter la courbe (\mathcal{C}) et la droite (D) dans un même repère orthonormé.

Partie II

1/ Déterminer la dérivée de la fonction u définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$u(x) = (\ln(x))^2$$

2/ En déduire que :

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2 + 11}{8}$$