

Calculatrice interdite ; traiter 12 exercices sur les 16 en 2 h 30 ; répondre par Vrai ou Faux sans justification. +1 si bonne réponse, -1 si mauvaise réponse, 0 si pas de réponse, bonus d'1 point pour un exercice entièrement juste.

■ Exercice 1

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.

On appelle D l'ensemble de définition de f .

a. $D =]-1; +1[$.

b. f est paire.

c. f est décroissante sur D .

d. Quel que soit le réel b , l'équation $f(x) = b$ possède l'unique solution $x = \frac{e^{2b} - 1}{e^{2b} + 1}$.

■ Exercice 2

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = \frac{x+1}{x} e^{-\frac{1}{x}}$ si $x \neq 0$ et

$f(0) = 0$. On appelle C la courbe représentant f dans un repère du plan.

a. f est continue en 0.

b. f est dérivable sur \mathbb{R}^{-*} et sur \mathbb{R}^{+*} et, pour $x \neq 0$, $f'(x)$ est du signe de x .

c. C possède la même droite pour asymptote en $+\infty$ et en $-\infty$.

d. Quel que soit le réel x , on a $f(x) < 1$.

■ Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $[1; +\infty[$ par : $f(t) = \sin(\ln t)$; on appelle C la courbe représentant f dans un repère orthonormal du plan.

Soit F la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par $F(x) = \int_1^x f(t) dt$.

a. On a $f(e) = \frac{\pi}{2}$.

b. Si $t \in [1; e^\pi]$, alors on a $f(t) \geq 0$.


c. $F(e^\pi)$ représente l'aire de la surface limitée par la courbe C et les droites d'équations $x = 1$, $x = e^\pi$ et $y = 0$.

d. Quel que soit $x > 1$, on a $F'(x) \leq 1$.

■ Exercice 4

On considère une fonction f définie et deux fois dérivable sur \mathbb{R} .

On appelle Γ la courbe représentant f et C la courbe représentant la fonction dérivée f' de f . On a représenté ci-dessous la courbe C de f' : C est symétrique par rapport à l'origine du repère. La droite Δ est la tangente à C au point d'abscisse 0.



a. La courbe Γ de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$.

c. La courbe Γ possède une et une seule tangente parallèle à l'axe des abscisses.

d. On a $f''(0) = 1$.

■ Exercice 5

a. $\int_{-5}^7 |x| dx = 12$ J.

b. $\int_0^1 (2x+5)e^x dx = 5e - 3$.

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)(e^x - 1)}{x} = 2$.

d. Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2 \sin^2 x$. f est dérivable sur \mathbb{R} et, pour $x \in \mathbb{R}$, on a $f'(x) = 2x \sin^2 x + x^2 \cos^2 x$.

■ **Exercice 6**

a. On considère un tétraèdre $ABCD$. On appelle I le milieu de $[AD]$, J celui de $[BC]$, K le barycentre de $\{(A; 2), (B; 1)\}$, L le barycentre de $\{(C; 1), (D; 2)\}$ et G le barycentre de $\{(A; 2), (B; 1), (C; 1), (D; 2)\}$.

On veut montrer que les points I, J, K et L sont coplanaires. On tient pour cela le raisonnement suivant :

« G est le barycentre de $\{(I; 4), (J; 2)\}$ et de $\{(K; 3), (L; 3)\}$. Donc G, I et J sont alignés, ainsi que G, K et L sont alignés. On en déduit que I, J, K et L sont coplanaires. » *Ce raisonnement est exact.*

b. On considère les deux intégrales $I = \int_{\ln 2}^{\ln 8} \frac{e^x + 3}{e^x + 4} dx$ et $J = \int_{\ln 2}^{\ln 8} \frac{1}{e^x + 4} dx$.

On veut calculer I et J . On tient pour cela le raisonnement suivant :

« On a $I + J = \int_{\ln 2}^{\ln 8} \frac{e^x + 4}{e^x + 4} dx = \ln 8 - \ln 2 = 2 \ln 2$.

De plus, $I - 3J = \int_{\ln 2}^{\ln 8} \frac{e^x}{e^x + 4} dx = \left[\ln(e^x + 4) \right]_{\ln 2}^{\ln 8} = \ln 12 - \ln 6 = \ln 2$.

On en déduit $I = \frac{7 \ln 2}{4}$ et $J = \frac{\ln 2}{4}$. » *Ce raisonnement est exact.*

c. On considère la fonction f définie sur \mathbb{R}^{+*} par : $f(x) = x \ln x$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$. On appelle C la courbe représentant f dans un repère du plan. On cherche à savoir si C possède ou non une demi-tangente au point d'abscisse 0. On tient pour cela le raisonnement suivant :

« On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (limite de référence). Comme $f(0) = 0$, c'est que f est

continue en 0. De plus on a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$. On en déduit que C possède

au point d'abscisse 0 une demi-tangente d'équation $x = 0$. » *Ce raisonnement est exact.*

d. On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$. On appelle C la courbe représentant f dans un repère. On cherche à savoir si C possède ou non une tangente au point d'abscisse 0. On tient pour cela le raisonnement suivant :

« Pour tout $x \neq 0$, on a : $-1 < \sin\left(\frac{1}{x}\right) < 1$, donc $-x^2 < f(x) < x^2$.

Or $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2) = 0$ donc, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Comme $f(0) = 0$, c'est que f est continue en 0.

De plus f est dérivable sur \mathbb{R}^{-*} et sur \mathbb{R}^{+*} et, pour $x \neq 0$, on a

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Or on a $-x \leq 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x$ si $x > 0$ et $x \leq 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq -x$ si $x < 0$. Donc

$\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$. Mais comme $\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'existe pas, alors $f(x)$ n'a pas de limite quand x tend vers 0. Donc f n'est pas dérivable en 0. On en déduit que C ne possède pas de tangente au point d'abscisse 0. » *Ce raisonnement est exact.*

■ Exercice 7

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. À chaque point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = z^2 + z + 1$.

On appelle A le point d'affixe 1 et on note E_0 l'ensemble des points dont l'affixe z est solution de l'équation $z' = 0$.

a. Pour tout z différent de 1, on a $z' = \frac{1 - z^3}{1 - z}$.

b. L'ensemble E_0 est réduit à deux points B et C symétriques l'un de l'autre par rapport à l'axe $(O; \vec{u})$.

c. Quel que soit le point M d'affixe z appartenant à E_0 et quel que soit l'entier n , z^n est soit l'affixe du point A , soit celle d'un élément de E_0 .

d. L'ensemble des points M d'affixe z tels que $z' \in \mathbb{R}$ est la réunion de deux droites perpendiculaires.

■ Exercice 8

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère, dans \mathbb{C} , l'équation (E): $z^2 - 2\bar{z} + 1 = 0$.

a. Les complexes $-1 + 2i$ et son conjugué sont solutions de (E).

b. Cette équation est une équation polynômiale de degré 2 qui possède deux solutions.

c. On pose $z = x + iy$, x et y étant réels.

Si z est solution de (E), alors $y^2 = (x - 1)^2$.

d. La somme des solutions de (E) est égale à -1 .

■ **Exercice 9**

On considère un triangle ABC et le point M milieu de $[BC]$.


On appelle B' l'image de B par la rotation de centre A et

d'angle $\frac{\pi}{2}$ et C' l'image de C

par la rotation de centre A et

d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

On munit le plan complexe d'un repère de centre A dans lequel B, C, B', C' et M ont les affixes respectives b, c, b', c' et m .



a. $c' + ic = 0$ et $b' - ib = 0$.

b. $\frac{c' - b'}{m} = -2i$.

c. (AM) et $(B'C')$ sont perpendiculaires.

d. $B'C' = 2AM$.

■ **Exercice 10**

Soient $a \in \mathbb{R}$ et φ une fonction définie et continue sur \mathbb{R} . On considère l'équation différentielle $[E] : y' + ay = \varphi(x)$.

a. Si φ est définie par $\varphi(x) = x^3 - 1$ alors, quel que soit le réel a , il existe un polynôme de degré 2, solution de $[E]$.

b. Si φ est définie par $\varphi(x) = e^{2x}$, alors quel que soit le réel a , il existe $b \in \mathbb{R}$ tel que la fonction f , définie par $f(x) = be^{2x}$ soit solution de $[E]$.

c. Si φ est la fonction constante nulle et si f est une solution de $[E]$, alors la courbe représentant f possède au point d'abscisse 0 une tangente d'équation $y = (1 - ax)f(0)$.

d. Si $a = 0$, alors quelle que soit la fonction φ définie et continue sur \mathbb{R} , $[E]$ possède une solution.

■ **Exercice 11**

On considère la suite u définie par $u_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{n+1} = \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right) u_n.$$

a. La suite u est géométrique de raison $\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$.

- b. Quel que soit $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{n}{(n-1)!}$.
- c. La suite u est décroissante à partir de $n = 2$.
- d. La suite u est convergente.

■ Exercice 12

Soit la fonction f définie sur $I =]-\infty; 3[$ par $f(x) = \frac{2}{3-x}$ et u la suite définie par $u_0 = 1,5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

- a. f est croissante.
- b. u est croissante.
- c. Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, on a : $1 < u_n < 2$.
- d. Si u est convergente et si l est sa limite, alors l est solution de l'équation $f(x) = x$.

■ Exercice 13

On considère la suite u définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2}(u_n)^2$. On admettra que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n > 0$. On considère alors la suite v définie par $v_n = \ln(\sqrt{2} u_n)$.

- a. La suite v est géométrique.
- b. $v_{10} = -512 \times \ln 2$.
- c. Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n v_k = (\ln 2)(1 - 2^n)$.
- d. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_0 \times u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n = \frac{1}{2^{2^n}}$.

■ Exercice 14

On dispose de quatre urnes numérotées de 1 à 4. Les urnes sont composées ainsi :

- Urne U_1 : 1 boule bleue et 3 boules rouges ;
 Urne U_2 : 2 boules bleues et 4 boules rouges ;
 Urne U_3 : 3 boules bleues et 5 boules rouges ;
 Urne U_4 : 6 boules rouges.

Un joueur choisit une urne au hasard, puis prélève une boule au hasard de cette urne. Le joueur est gagnant s'il tire une boule bleue; il est perdant sinon. On désigne par :

- Ω l'univers des possibilités et P la probabilité associée ;
- P_A la probabilité conditionnée par un événement A de Ω ;
- G l'événement : « le joueur gagne » ;
- U_n l'événement : « le joueur choisit l'urne U_n ».

a. $P_{U_1}(G) = \frac{2}{3} P_{U_3}(G)$.

b. $P(G) = \frac{9}{8}$.

c. $P(U_1) = \frac{1}{6}$.

d. $P_{U_2}(G) = P_G(U_2)$.

■ **Exercice 15**

L'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 2, 3)$, $B(-1, 4, 3)$, $C(-2, 1, 3)$ et $D(5, 4, -3)$.

On appelle K le barycentre de $\{(C, 1); (D, -2)\}$ et J le milieu de $[BC]$. On admet que les points A, B et C ne sont pas alignés.

a. Dans le triangle ABC , les médianes se coupent au point de coordonnées : $(-2, 7, 9)$.

b. Les coordonnées de K sont $(-12, -7, 9)$.

c. Une équation paramétrique du segment $[KJ]$ est $\begin{cases} x = 12 - 9t \\ y = 7 - 3t \\ z = -9 + 8t \end{cases}$, où $t \in \left[0; \frac{3}{2}\right]$.

d. Une équation du plan perpendiculaire à (KJ) passant par A est : $9x + 3y - 8z + 9 = 0$.

■ **Exercice 16**

L'espace est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le plan

P d'équation $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$ et la droite D d'équation $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ z = 0 \end{cases}$.

Soient $A(1, 1, 1)$, $B(3, 5, -3)$ et $C(1, -4, 2)$.

a. A et B sont deux points de P.

b. D est perpendiculaire à P.

c. La distance de C à P est $\sqrt{5}$ (en unités de repère).

d. L'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que :

$$(x-1)(x-3) + (y-1)(y-5) + (z-1)(z+3) = 0$$

est la sphère de diamètre $[AB]$.

■ Un peu de stratégie

C'est un Vrai/Faux avec quelques pièges comme souvent. Soyez vigilants... Pensez aussi que seuls 12 exercices sont corrigés et qu'il y a des pénalités qui peuvent coûter cher. Alors commencez vraiment par vos thèmes préférés ! Et si vous bloquez, passez à la suite !

■ Grille des réponses

1.a	V	3.a	F	5.a	F	7.a	V	9.a	V	11.a	F	13.a	V	15.a	F
1.b	F	3.b	V	5.b	V	7.b	V	9.b	V	11.b	V	13.b	V	15.b	F
1.c	F	3.c	V	5.c	F	7.c	V	9.c	V	11.c	V	13.c	F	15.c	V
1.d	V	3.d	V	5.d	F	7.d	V	9.d	V	11.d	V	13.d	F	15.d	V
2.a	F	4.a	V	6.a	V	8.a	V	10.a	F	12.a	V	14.a	V	16.a	V
2.b	V	4.b	F	6.b	V	8.b	F	10.b	F	12.b	F	14.b	F	16.b	F
2.c	V	4.c	V	6.c	V	8.c	V	10.c	V	12.c	V	14.c	F	16.c	V
2.d	V	4.d	V	6.d	F	8.d	V	10.d	V	12.d	V	14.d	F	16.d	V

■ Exercice 1

a. VRAI. La fonction définie par $f(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ est définie sur l'ensemble des réels x tels que : $\frac{1+x}{1-x} > 0$. On construit le tableau de signe suivant qui permet de conclure que : $D =]-1; +1[$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$1+x$		$-$	0	$+$
$1-x$		$+$	$+$	0
$\frac{1+x}{1-x}$		$-$	0	$+$
				$-$

b. FAUX. Même si $D =]-1; +1[$ est symétrique par rapport à 0, on a :

$$f(-x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = -\frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = -f(x). \text{ Donc } f \text{ est impaire.}$$