

Kartable

Tle

Spécialité

Maths



Cours




Savoir-faire



Exos type BAC



Corrigés




Encore plus d'exercices
sur www.kartable.fr



PARTIE I

ALGÈBRE ET GÉOMÉTRIE



Chapitre 1

Combinatoire et dénombrement

I Les notions ensemblistes

Quand on parle d'ensembles ayant un nombre fini d'éléments, on s'intéresse aux listes d'éléments que l'on peut former ainsi qu'à la façon de regrouper différents ensembles. Pour cela il existe trois opérateurs : l'union, l'intersection et le produit cartésien.

■ Remarque

Les ensembles considérés dans ce chapitre sont finis mais les notions introduites dans cette section seront introduites dans le cas général.

■ Exemple

L'ensemble des « couleurs » dans un jeu de 32 cartes est un ensemble fini :
{pique, cœur, carreau, trèfle}

Définition ► Liste ou k -uplet

On appelle **liste** (d'ordre k) ou **k -uplet** toute suite ordonnée de k éléments d'un ensemble. On note cette liste (ou k -uplet) entre parenthèses.

■ Exemple

Soit A le point de coordonnées $(2; 4)$ dans le plan muni d'un repère. Les coordonnées du point A forment une liste à deux éléments. On dit aussi 2-uplet ou couple.

Définition ► Réunion des ensembles

Soient n un entier naturel non nul et E_1, E_2, \dots, E_n des ensembles.

On appelle **réunion des ensembles** E_1, E_2, \dots, E_n notée $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$, l'ensemble constitué des éléments qui appartiennent à au moins l'un des ensembles E_1, E_2, \dots, E_n .

Exemple

Dans un lycée, on note U l'ensemble des élèves inscrits à l'UNSS et T celui des élèves de terminale. La réunion $U \cup T$ est l'ensemble des élèves du lycée appartenant à au moins un des deux groupes U et T .

Cet ensemble est donc constitué des élèves inscrits à l'UNSS, quelle que soit leur classe, auxquels on ajoute les élèves de terminale non inscrits à l'UNSS.

Exemple

On considère les ensembles suivants :

- A : ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à 20 et multiples de 2 ;
- B : ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à 20 et multiples de 3 ;
- C : ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à 20 et multiples de 5.

Alors, on a :

- $A = \{0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20\}$
- $B = \{0; 3; 6; 9; 12; 15; 18\}$
- $C = \{0; 5; 10; 15; 20\}$

La réunion des trois ensembles A , B et C est :

$$A \cup B \cup C = \{0; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20\}$$

Définition**Intersection de deux ensembles**

Soient A et B deux ensembles. On appelle **intersection des deux ensembles** A et B , notée $A \cap B$, l'ensemble constitué des éléments qui appartiennent aux deux ensembles A et B .

Exemple

On considère les ensembles suivants :

- A : ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à 20 et multiples de 2 ;
- B : ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à 20 et multiples de 3.

Alors, on a :

- $A = \{0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20\}$
- $B = \{0; 3; 6; 9; 12; 15; 18\}$

L'intersection des ensembles A et B est :

$$A \cap B = \{0; 6; 12; 18\}$$

Définition**Produit cartésien de deux ensembles**

Soient A et B deux ensembles. **Le produit cartésien des deux ensembles** A et B , noté $A \times B$, est l'ensemble des couples (listes de 2 éléments) dont le premier élément est un élément de A et le deuxième élément un élément de B .

■ Exemple

Le produit cartésien de l'ensemble \mathbb{R} avec lui-même, noté $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, est l'ensemble des couples de deux réels. Il s'agit donc de l'ensemble des coordonnées des points du plan muni d'un repère.

■ Remarque

Soit un entier naturel non nul n et E_1, E_2, \dots, E_n des ensembles.

Le produit cartésien de ces n ensembles, noté $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, est l'ensemble des n -uplets dont le premier élément appartient à E_1 , le deuxième à E_2 , etc.

■ Exemple

On considère un jeu de 32 cartes constitué des quatre « couleurs » classiques (pique, cœur, carreau, trèfle).

On note P l'ensemble des piques, C_1 l'ensemble des cœurs, C_2 l'ensemble des carreaux et T l'ensemble des trèfles.

Le produit cartésien $P \times C_1 \times C_2 \times T$ est l'ensemble des 4-uplets (ou quadruplets) dont :

- le premier élément est un pique ;
- le deuxième élément est un cœur ;
- le troisième élément est un carreau ;
- le quatrième élément est un trèfle.

Propriété Soit \mathcal{A} un ensemble.

On note \mathcal{A}^k l'ensemble des k -uplets d'éléments de l'ensemble \mathcal{A} .

II Le dénombrement

Que ce soit avec des ensembles de nombres, d'objets concrets ou d'objets plus abstraits, on cherche souvent à connaître le nombre d'éléments d'un ensemble (le cardinal), et les possibilités de découpage de cet ensemble en sous-parties.

A Le cardinal d'un ensemble

Lorsque l'on travaille avec des ensembles ayant un nombre fini d'éléments, on est souvent amené à compter des éléments. On appelle cardinal d'un ensemble le nombre d'éléments de cet ensemble.

Définition Cardinal d'un ensemble fini

On appelle **cardinal d'un ensemble** ayant un nombre **fini** d'éléments, le nombre d'éléments de cet ensemble.

Exemple

L'ensemble des entiers naturels inférieurs ou égaux à 20 est l'ensemble :
 $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20\}$
 Il compte 21 éléments. Son cardinal est donc 21.

Propriété

Soient E un ensemble fini et A et B deux parties de E disjointes.

Le cardinal de la réunion de A et de B est la somme des cardinaux des parties A et B .

Exemple

Soit E l'ensemble des entiers naturels non nuls inférieurs ou égaux à 50.

Soit A le sous-ensemble de E des multiples de 7 et B le sous-ensemble de E des multiples de 11.

On a :

- $A = \{7; 14; 21; 28; 35; 42; 49\}$
- $B = \{11; 22; 33; 44\}$

A est de cardinal 7.

B est de cardinal 4.

Comme A et B sont disjointes, le cardinal de $A \cup B$ est : $7 + 4 = 11$

Remarque

On parle du principe additif du cardinal pour la réunion de deux ensembles disjointes.

Remarque

Soient A et B deux ensembles non disjointes.

Si on note $\text{card}(E)$ le cardinal d'un ensemble E , alors :

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

Exemple

Soit A l'ensemble des entiers compris entre 0 et 10 et B l'ensemble des multiples de 5 compris entre 0 et 20.

$$\text{On a donc : } A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\} \quad B = \{0; 5; 10; 15; 20\}$$

$$\text{Alors : } A \cup B = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20\} \quad A \cap B = \{0; 5; 10\}$$

$$\text{Ainsi : } \text{card}(A) = 11 \quad \text{card}(B) = 5 \quad \text{card}(A \cap B) = 3 \quad \text{card}(A \cup B) = 13$$

$$\text{Par conséquent : } \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) = 11 + 5 - 3 = 13.$$

$$\text{On a bien : } \text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B).$$

Propriété

Soient E et F deux ensembles finis de cardinaux respectifs n et p . Alors le cardinal du produit cartésien $E \times F$ est :

$$\text{card}(E \times F) = n \times p$$

Exemple

Soit $E = \llbracket 0;9 \rrbracket$ l'ensemble des entiers naturels compris entre 0 et 9 et soit

$F = \llbracket 0;19 \rrbracket$ l'ensemble des entiers naturels compris entre 0 et 19.

- Le cardinal de E est 10;
- Le cardinal de F est 20.

L'ensemble $E \times F$ est constitué des couples d'entiers dont le premier est compris entre 0 et 9 et le deuxième entre 0 et 19.

Le cardinal de $E \times F$ est donc :

$$10 \times 20 = 200$$

Propriété

Soient p un entier naturel non nul et E_1, E_2, \dots, E_p p ensembles de cardinaux respectifs n_1, n_2, \dots, n_p . Alors le cardinal du produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est :

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$$

Exemple

Soit $E = \llbracket 1;10 \rrbracket$ l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et 10.

L'ensemble $E^3 = E \times E \times E$ est l'ensemble des triplets d'entiers appartenant chacun à E .

Le cardinal de E est 10.

Le cardinal de E^3 est donc :

$$10^3 = 1\,000$$

B Le nombre de k -uplets et de sous parties

Lorsque l'on travaille avec des ensembles ayant un nombre fini d'éléments, on peut dénombrer les éléments, les listes d'éléments et les sous-parties.

Propriété

Soient n un entier naturel non nul et E un ensemble de cardinal n . Soit k un entier naturel non nul. L'ensemble des k -uplets (ou k -listes) d'éléments de E , avec répétitions possibles, a pour cardinal :

$$n^k$$

Exemple

On considère l'ensemble $E = \{A; B; C; D; E\}$.

Les « mots » de trois lettres (avec répétitions possibles) appartenant à l'ensemble E , ayant un sens ou non, sont les triplets d'éléments de E . Leur nombre est donc :

$$5^3 = 125$$

Soit $E = \{0; 1\}$.

Les entiers naturels que l'on peut écrire en binaire sur un octet (huit bits) sont les octuplets, avec répétitions possibles, constitués d'éléments de l'ensemble E . Leur nombre est donc :

$$2^8 = 256$$

On peut donc écrire les entiers entre 0 et 255 en binaire sur un octet.

Définition**Factorielle**

Soit n un entier naturel. On appelle **factorielle** n , notée $n!$, le nombre défini par :

$$\begin{cases} 0! = 1 \\ n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1 \text{ si } n > 0 \end{cases}$$

Exemple

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Propriété

Soient n un entier naturel non nul et E un ensemble de cardinal n . Soit k un entier naturel compris entre 1 et n .

L'ensemble des k -uplets (ou k -listes) d'éléments de E obtenus sans répétition a pour cardinal :

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)$$

Exemple

Soit E l'ensemble des entiers compris entre 1 et 100. L'ensemble des triplets d'éléments de E pris sans répétition est de cardinal :

$$\frac{100!}{97!} = 100 \times 99 \times 98 = 970\,200$$

Définition**Permutation**

Soient n un entier naturel non nul et E un ensemble de cardinal n . On appelle **permutation** de l'ensemble E tout n -uplet d'éléments de E ne comportant pas de répétition.

Exemple

Soit E l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et 10.

$(1; 3; 5; 7; 9; 2; 4; 6; 8; 10)$ est une permutation de l'ensemble E .

Propriété

Soient n un entier naturel non nul et E un ensemble de cardinal n . Le nombre de permutations de l'ensemble E est :

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$$

Exemple

Soit E l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et 10. Le nombre de permutations de l'ensemble E est : $10! = 10 \times 9 \times 8 \times \dots \times 1$.

Soit 3 628 800.

Propriété

Soient n un entier naturel non nul et E un ensemble de cardinal n . Soit k un entier naturel non nul compris entre 0 et n . Le nombre de sous-ensembles de E à k éléments est :

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-k+1)}{k \times (k-1) \times \dots \times 1}$$

Exemple

Soit E l'ensemble des élèves d'une classe de terminale en comptant 30.

Le nombre de binômes différents possibles est :

$$\frac{30!}{2!(30-2)!} = \frac{30!}{2!28!}$$

Soit :

$$\frac{30 \times 29 \times \dots \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 28 \times 27 \times \dots \times 2 \times 1}$$

Soit après simplification partielle :

$$\frac{30 \times 29}{2 \times 1} = 15 \times 29 = 435$$

Propriété

Soit n un entier naturel non nul. Soit E un ensemble de cardinal n . Le nombre de parties de E , c'est-à-dire le nombre de sous-ensembles de E , de l'ensemble vide à E tout entier, est :

$$2^n$$

Exemple

Soit $E = \llbracket 1; 3 \rrbracket$ l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et 3.

Le nombre de sous-ensembles de E est :

$$2^3 = 8$$

Les sous-ensembles de E sont les suivants :

\emptyset

$\{1\}$

$\{2\}$

$\{3\}$